











||| campagne d'automne 2023

	 Pfizer NEW 6 mois - 4 ans XBB	 Pfizer NEW 5 - 11 ans XBB	 Pfizer NEW + 12 ans XBB	 novavax + 18 ans classique	 novavax NEW + 18 ans XBB	 sanofi + 18 ans classique
Utilisation	primovaccination et/ou dose unique	1 dose unique (personne ciblée ou non par une recommandation)				
	seuls vaccins disponibles pour ces âges		1 ^{ère} intention	ne sera bientôt plus disponible	2nd intention en cas de contre-indication aux vaccins à ARNm	ne sera bientôt plus disponible
Bouchon	bordeaux	bleu	gris	bleu	?	vert
Dosage	3 µg / dose	10 µg / dose	30 µg / dose	5 µg / dose	?	5 µg / dose
Préparation	à diluer 	PAE	PAE	PAE	PAE	à diluer 
Nb doses /flacon	10	6	6	10	5	10
Conserv. des flacons congelés	- 80°C			non concernés		
Conserv. des flacons fermés 	10 semaines entre 2 et 8°C			9 mois entre 2 et 8 °C	?	1 an entre 2 et 8°C
Conserv. des flacons ouverts 	12 heures entre 2 et 30°C			6 heures entre 2 et 25°C	?	6 heures entre 2 et 25°C
RCP (liens hypertextes)	RCP p. 344 (conserv. p 372)	RCP p. 314 (conserv. p 337)	RCP p. 255 (conserv. p 276)	RCP p. 2 (conserv. p 16)	?	RCP p. 2 (conserv. p 10)